Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PEMBERIAN HIGH ALERT MEDICATIONS "INFUS KONTINU FENTANYL DI ICU"**		
	No. Dokumen SPO/262/PKPO.Akr/VIII/2026	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 September 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Obat high alert atau obat dengan kewaspadaan tinggi adalah obat obatan yang memiliki risiko yang tinggi apabila penggunaaannya salah, serta dapat menimbulkan kerugian yang besar terhadap pasien. Pemberian obat high alert adalah tahapan proses dalam penggunaan obat high alert untuk tindakan terapi pasien.
Tujuan	Untuk menjamin ketepatan penggunaan obat untuk terapi pasien
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/151VIII/2026 tentang Panduan Meningkatkan Obat-obat yang Harus Diwaspadai (*High Alert Medications*).
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887). 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017. 4. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023 5. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Pedoman keselamatan penggunaan obat high alert di rumah sakit. Jakarta: PAFI; 2022. 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang

	Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit; 7. Perhimpunan Farmasi Rumah Sakit Indonesia. Pedoman pengelolaan obat high alert dan LASA di rumah sakit. Jakarta: PERSI; 2022.
Prosedur	1. Perawat melakukan prosedur 6 langkah cuci tangan 2. Perawat memasang APD. 3. Perawat menyiapkan sediaan Fentanyl kosentrasi standar 10 mcg/ml atau kosentrasi tinggi 50 mcg/ml (beri label konsentrasi tinggi) sesuai instruksi dokter, 4. Perawat menuliskan nama obat pada label infus untuk penambahan obat high alert pada cairan infus. 5. Dua orang perawat melakukan prosedur pengecekan ganda. 6. Perawat melakukan verifikasi identitas pasien. 7. Perawat memberikan informasi kepada pasien akan dilakukan tindakan pemberian obat. 8. Perawat menuliskan nama obat pada label infus untuk penambahan obat high alert pada cairan infus. 9. Perawat menempelkan label high alert warna merah pada infus. 10. Perawat mengatur kecepatan pemberian obat sesuai instruksi dokter. 11. Dua orang perawat melakukan prosedur pengecekan ganda dan mencatat pada status rekam medis pasien atau pada catatan pemberian obat pasien.
Unit Terkait	ICU